

# Rilevazione del numero di vaccinazioni antinfluenzali stagionali 2012/13

Regione Siciliana ASP Messina Distretto di \_\_\_\_\_

Tipologia di vaccino (per ogni tipologia di vaccino compilare una tabella diversa):

- Split
- Sub-unità
- Adjuvato con MF59
- Adjuvato con virosomi (virosomiale)
- Intradermico

### Fasce di età

Categorie	Fasce di età							
	6-23 mesi (2 dosi) *	2-4 anni (2 dosi) *	5-8 anni (2 dosi) *	9-14 anni	15-17 anni	18-44 anni	45-64 anni	≥ 65 anni
Soggetti di età pari o superiore a 65 anni								
Soggetti di età compresa fra 6 mesi e 65 anni con condizioni di rischio (vedi paragrafo 3.2.2)								
Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico								
Donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza								
Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti								
Medici e personale sanitario di assistenza								
Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio								
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori								
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani								
Popolazione generale (escluse le categorie di cui sopra)								
<b>Totale</b>								

LEGENDA: le celle grigie non vanno considerate;

\* Se vaccinato per la prima volta

*Il Medico*

data di ricezione: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

*Il Funzionario Responsabile*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_